Ficha técnica

Agroestime®

HumiMax® Forte
MEJORADOR DE SUELOS

Polvo soluble
Presentación: 1 y 10 kg

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ácidos húmicos	65%
Potasio (K_2O)	4%

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO:

APLICACIONES EN RIEGO	DOSIS L/ha	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Jitomate	2.0-2.5-3.0	Realizar primera aplicación al momento de trasplante, la segunda y tercera aplicación durante el desarrollo vegetativo, la cuarta aplicación en floración y la quinta aplicación en fructificación.
Tomate de cascara, Papa, Tabaco, Chile, Chile Bell, Berenjena y Pimiento	2.0	Primer riego de preemergencia o después del trasplante.
	3.0	Primer riego de postemergencia.
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Sandía y Pepino	2.0	Primer riego de preemergencia o después del trasplante.
	3.0	Primer riego de postemergencia.
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).
Arándano	2.0-2.5-3.0	Realizar primera aplicación al momento de la poda, la segunda y tercera aplicación durante el desarrollo vegetativo, la cuarta aplicación en floración y la quinta aplicación en fructificación.
Tejocote, Rosal, Manzana, Pera, Fresa, Almendro, Cerezo, Durazno, Frambuesa, Ciruelo, Membrillo, Mora, Zarzamora, Chabacano y Melocotón	2.0	Primer riego de preemergencia o después del trasplante
	3.0	Primer riego de postemergencia.
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).

Ficha técnica

HumiMax® Forte
MEJORADOR DE SUELOS

APLICACIONES EN RIEGO	DOSIS L/ha	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Aguacate	2.0	Primer riego de brotación
	3.0	Riego para floración
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).
Lechuga, Espárrago, Col, Coliflor, Brócoli, Col de Bruselas, Cebolla, Cebollín, Ajo	2.0	Primer riego de preemergencia o después del trasplante
	3.0	Primer riego de postemergencia.
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).
Maíz	2.0-2.5-3.0	Realizar primera aplicación al momento de preparación del terreno, la segunda y tercera aplicación durante el desarrollo vegetativo, la cuarta aplicación en floración y la quinta aplicación en fructificación.
Trigo, Sorgo, Avena, Cebada	2.0	Primer riego de preemergencia o después del trasplante
	3.0	Primer riego de postemergencia.
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).
Nogal, Agave, Uva, Papayo, Plátano, Mango	2.0	Primer riego de preemergencia o después del trasplante
	3.0	Primer riego de postemergencia.
	2.5	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración y fructificación).

Aplicación vía riego Aplicación vía foliar

INFORMACIÓN GENERAL

HUMIMAX® FORTE es un mejorador de suelos orgánico, formulado a partir de humato de potasio. **HUMIMAX® FORTE** mejora las propiedades físicas y químicas de los suelos haciéndolos más ligeros y manejables; aumenta la capacidad de intercambio catiónico elevando la nutrición en las plantas, reduce la presencia de sales nocivas para el desarrollo de los cultivos y estimula el desarrollo radicular de las plantas. Para un uso correcto se deberá se deberán seguir las instrucciones de uso recomendadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

HUMIMAX® FORTE es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, en el caso de que se amerite su mezcla con otros productos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previo a la mezcla definitiva.