Agroestime®

Ficha técnica

Multiamin® Micros
FERTILIZANTE LÍQUIDO

Líquido
RSCO-448/XI/22
Presentación: 1, 5, 20 y 1,000 L

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Zinc (Zn)	2.06%
Boro (B)	1.81%
Hierro (Fe)	2.92%
Manganeso (Mn)	1.17%
Molibdeno (Mo)	0.0054%

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS L / 200 L DE AGUA	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Ajo y cebolla	1.5	A la formación de la novena o décima hoja.
	2	Inicio del desarrollo del bulbo y repetir cada 8 días hasta cosecha.
Chile, jitomate y berenjena	1.5	Aplicar a los 8 días del trasplante.
	2	Aplicar cada 8 días hasta la floración y amarre de fruto.
	3	Aplicar cada 10 días desde desarrollo de fruto hasta cosecha.
Melón, pepino y sandía	1.5	Aplicar a los 10 días de la emergencia.
	2	Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo (desarrollo, floración prendimiennto y desarrollo del fruto).
Acelga, cebollín, cilantro, col, espinaca, lechuga y tabaco	1.5	Aplicar a la formación de las 9 o diez hojas verdaderas y repetir a los 10 días.
Papa	1.5	Aplicar al 100% de emergencia.
	1.5	Inicio de la parición.
	2	Inicio de la tuberización.
	2.5	Al inicio del desarrollo del tubérculo.

Ficha técnica

Agroestime®

Multiamin® Micros
FERTILIZANTE LÍQUIDO

CULTIVO	DOSIS L / 200 L DE AGUA	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Banano, piña y agave	2	Inicio de la formación del fruto.
	2.5	Desarrollo del fruto.
Arroz, caña de azúcar, cebada, maíz y sorgo	1.5	Aplicar al inicio a la formación del tercer nudo.
	2	Aplicar a la formación del grano.
Algodón, cacahuate, frijol, garbanzo, alubia y soya	1.5	Hacer aplicaciones al inicio de la floración y a la formación de vainas o cuadros en el caso de algodón.
Aplicación en invernadero (varios cultivos o trasplante)	1 cc/L de agua	A la formación del primer par de hojas verdaderas.
	2 cc/ L de agua	A la formación del segundo par de hojas verdaderas.
	3 cc/ L de agua	A la formación del tercer o cuarto par de hojas verdaderas.

Aplicación vía foliar

INFORMACIÓN GENERAL

MULTIAMIN® MICROS es un fertilizante que contiene: zinc, boro, hierro, manganeso y molibdeno, siendo estos microelementos los que participan en las reacciones fisiológicas y metabólicas para el crecimiento de la planta, la floración, el amarre y el desarrollo de los frutos. Los síntomas por deficiencia de zinc se presentan en la clorosis y el achaparrado de las plantas. Cuando en la planta existe deficiencia de boro se presentan daños en los meristemos apicales lo que ocasiona achaparramiento de las plantas. La deficiencia por hierro se manifiesta por la presencia de hojas cloróticas y algunas veces de color blanco por la incapacidad de las hojas de sintetizar clorofila. Los síntomas por deficiencia de manganeso son clorosis entre las venas, seguida de lesiones necróticas. La deficiencia por molibdeno se caracteriza por una clorosis entre las venas en hojas viejas y progresa hacía hojas jóvenes.

INCOMPATIBILIDAD

MULTIAMIN® MICROS solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.