Agroestime®

Ficha técnica

Metamin max®
FERTILIZANTE ORGÁNICO

Polvo soluble
RSCO-074/III/09
Presentación: 200 g , 1 y 10 kg

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ácido Glutámico	64.92 %
Tiamina	5.08 %

DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS g/ha	VÍA DE APLICACIÓN	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Jitomate, tomate de cáscara, chile y berenjena	500 g.	Riego	Aplicar 8 días después del trasplante y repetir en etapas críticas del desarrollo del cultivo (floración, amarre y crecimiento del fruto).
	300 g.	Foliar	
Pepino, melón, sandía y fresa	500 g.	Riego	Aplicar a los 15 días del trasplante y repetir al inicio de la floración y después de cada corte.
	300 g.	Foliar	
Cebolla	500 g.	Riego	Aplicar a los 30 días del trasplante y/o siembra y repetir al inicio de la formación del bulbo.
	300 g.	Foliar	
Ajo	400 g.	Riego	Aplicar a la formación de la sexta o novena hoja y repetir cada 15 días hasta el inicio de la formación del bulbo.
	300 g.	Foliar	Aplicar al inicio de la formación del bulbo y repetir a los 5 días.
Maíz, trigo y sorgo	400 g.	Riego	Aplicar a la formación del tercer o cuarto entrenudo.
	200 g.	Foliar	
Papa	400 g.	Riego	Aplicar a la parición y repetir al inicio de la formación del tubérculo.
	300 g.	Foliar	
Lechuga	400 g.	Riego	Aplicar a los 10 días del trasplante y repetir al inicio de la formación de la cabeza.
	200 g.	Foliar	
Papayo y banano	500 g.	Riego	Aplicar a los 10 días después del trasplante, a la formación de los frutos, y después de cada corte.
	350 g.	Foliar	
Nogal y durazno	500 g.	Foliar	Aplicar al inicio de la floración y repetir al inicio de la formación del fruto.

Agroestime®

Ficha técnica

Metamin max®
FERTILIZANTE ORGÁNICO

CULTIVO	DOSIS g/ha	VÍA DE APLICACIÓN	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Estrés por bajas temperaturas	400 g.	Riego	Aplicar cada 15 días en periodos de bajas temperaturas.
	250 g.	Foliar	
Estrés por falta de agua y altas temperaturas	500 g.	Riego	Aplicar en periodos críticos de altas temperaturas y de falta de humedad.
	300 g.	Foliar	
Producción en invernadero de chile, jitomate, pepino y fresa	500 g.	Riego	Aplicar cada semana.

Aplicación vía riego Aplicación vía foliar

INFORMACIÓN GENERAL

METAMIN MAX® es un fertilizante orgánico con función de activador metabólico con base en ácido glutámico, un aminoácido tipo L y Tiamina. El Ácido Glutámico, es un aminoácido esencial en el proceso de la transaminación; mecanismo mediante el cual se crean a partir de éste nuevos aminoácidos importantes en la fabricación de las proteínas, necesarias en la formación, desarrollo y crecimiento de las plantas y frutos. **METAMIN MAX®** incrementa la formación de la molécula de Trifosfato de Adenosina (ATP), elevando la producción de energía y actuando como catalizador para hacer que los Hidratos de Carbono liberen su energía cuando la planta se encuentra en condiciones de estrés por bajas y altas temperaturas, por falta de agua y por desequilibrios fisiológicos. Para optimización del producto, se deberán seguir las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

METAMIN MAX® no deberá aplicarse con productos con pH de fuerte reacción alcalina. Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.