

Polvo soluble  
RSCO-182/IX/07

Presentación: 1 kilogramo.

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nitrógeno (N)        | 23.00% |
| Fósforo ( $P_2O_5$ ) | 24.00% |
| Potasio ( $K_2O$ )   | 18.00% |

#### »DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN«

##### INSTRUCCIONES DE USO:

| CULTIVO                                                                                     | DOSIS Kg / HA EN 200 L DE AGUA | ÉPOCA Y MÉTODO DE USO                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajo y cebolla                                                                               | 1 a 2                          | Iniciar las aplicaciones a la formación de la segunda hoja y repetir cada 15 días hasta el inicio de la formación del bulbo.                                                 |
| Cítricos, mango, aguacate, guayabo, papayo, cafeto, duraznero, manzano, nogal, vid y banano | 1 a 2                          | Al comienzo de la brotación de las yemas, hasta el inicio de la floración y fructificación.                                                                                  |
| Chile, jitomate, pepino, col, coliflor, brócoli, melón y sandía                             | 1.5 a 2                        | Iniciar la aplicación de 5 a 8 días después del trasplante y repetir en forma semanal hasta el comienzo de la floración.                                                     |
| Maíz, arroz, cebada y sorgo                                                                 | 2 a 3                          | Iniciar la aplicación al comienzo de la formación del segundo par de hojas y repetir a los 5 días.                                                                           |
| Frijol, garbanzo, cacahuate, soya y algodón                                                 | 2                              | Hacer la primera aplicación a los 10 o 15 días después de la siembra y repetir cada 15 días hasta el inicio de la floración.                                                 |
| Espárrago y papa                                                                            | 2 a 3                          | Hacer la primera aplicación 8 días después de la brotación y repetir cada 10 días hasta la formación del turión en espárrago e inicio de la formación del tubérculo en papa. |
| Alfalfa                                                                                     | 1 a 2                          | Aplicar 10 días después de cada corte.                                                                                                                                       |
| Tabaco, espinaca, acelga y cilantro                                                         | 1 a 2                          | Primera aplicación a la aparición del segundo o cuarto par de hojas y repetir cada 5 días hasta el inicio de los cortes.                                                     |
| Invernadero (plantas para trasplante)                                                       | 1 kg/200 o 300 L de agua       | Hacer la primera aplicación al inicio de la formación del segundo par de hojas verdaderas y repetir cada 3 días hasta su trasplante.                                         |
| Cultivos ornamentales                                                                       | 10 a 15 g/L de agua            | Aplicar cada 2 o 3 semanas, según sea necesario.                                                                                                                             |
| Viveros                                                                                     | 40 a 50 g/L de agua            | Aplicar en viveros, semilleros y almácigos cada 10 o 15 días, según sea necesario.                                                                                           |



##### APLICACIÓN VÍA FOLIAR

#### »INFORMACIÓN GENERAL«

MULTIGRO® NPK es un fertilizante sólido a base de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, que por su elevada concentración ayuda al amarre de flores y frutos; su asimilación inmediata permite apoyar las etapas críticas del crecimiento y desarrollo de los cultivos. Se recomienda realizar análisis del suelo y consultar la dosis óptima de aplicación. Cuando en la planta existe deficiencia de Nitrógeno, las hojas se tornan en su totalidad amarillas; por deficiencia de Fósforo, el borde de las hojas se torna oscuro o negruzco y por deficiencia de Potasio se presentan bordes de las hojas quemadas o color café.

Para optimización del producto, se deberán seguir las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.

#### INCOMPATIBILIDAD

MULTIGRO® NPK solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

Agroestimulantes Mexicanos S.A. de C.V.  
Aldama No. 12 San Antonio Tepezalá, Ags. CP. 20630 México

Última revisión abril 2025