

Polvo soluble
RSCO-233/X/2012

Presentación: frasco de 75 y 150 gramos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ácido Naftalenacético 300 ppm
Tiamina **0.20 %**
 Fósforo (P₂O₅) 8.00 %

»DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN«

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS g/HA EN 200 L DE AGUA	ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN
Chile, jitomate, berenjena, tomate de cáscara, fresa, ajo, cebolla, papa, col, coliflor, brócoli, rábano, apio, espárrago, zanahoria, cilantro, acelga y lechuga. Pepino, melón y sandía	225 a 300	Con el equipo de aplicación asperjar en la base del tallo de los 5 a 8 días después de la germinación o del trasplante. Con el equipo del sistema de riego, aplicar al momento del trasplante, floración, fructificación y en etapas críticas de desarrollo del cultivo. Aplicar con un 80% de avance del periodo de riego.



APLICACIÓN VÍA RIEGO



APLICACIÓN VÍA FOLIAR

» INFORMACIÓN GENERAL «

RAIZAMIN MAX® es un regulador de crecimiento a base de Ácido Naftalenacético adicionado con Tiamina y Fósforo, que estimula e incrementa la división celular a nivel radicular, coadyuvando con la acumulación de los fotosintatos responsables de la formación de raíces primarias y secundarias en la planta; sobre todo, a partir de que aparece el primer par de hojas verdaderas y demás etapas de desarrollo de la planta. Lo que permite que se forme un sistema radicular abundante y eficiente, traduciendo en una mayor asimilación de agua y nutrientes para la planta. Para optimización del producto, se deberán seguir las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

RAIZAMIN® MAX no deberá aplicarse con productos con pH de fuerte reacción alcalina. Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

Agroestimulantes Mexicanos S.A. de C.V.
Aldama No. 12 San Antonio Tepezalá, Ags. CP. 20630 México

Última revisión abril 2025